

## ИНФЛУЕНЦА А (ПТИЧИ ГРИП) КАК ДА ПРЕДПАЗИТЕ ДОМАШНИТЕ ПТИЦИ

### КОИ ПТИЦИ БОЛЕДУВАТ

ДОМАШНИ ПТИЦИ (*пилета, патици, пъдпъдъци, фазани и пуйки*)

НЯКОИ ВИДОВЕ ДИВИ ПТИЦИ (*патици, лебеди и гъски*)

### КЛИНИЧНИ ПРИЗНАЦИ

- Внезапна смърт без предишни симптоми на заболяване
- Посиняване на гребена и менгушите
- Изтечения от носа, кашлица, кихане
- Умърлушеност и липса апетит
- Треперене и усукване на главата и врата
- Разрошена перушина
- Спад в производството на яйца и яйца с меки и деформирани черупки
- Невъзможност да стоят изправени – спъване и падане
- Подуване на клепачите и гребена
- Затруднено дишане



Пурпурно оцветяване на гребена и менгушите



Усукване на главата и шията



Парализа



Нарушена стойка на тялото



## КАК СЕ РАЗПРОСТРАНЯВА ПТИЧИЯТ ГРИП

- Директен контакт с болна птица
- Контакт със замърсени поставки за яйца и яйца, тор, оборудване, щайги, техника, ръце, обувки и дрехи
- Мигриращи водолюбиви птици (диви патици и гъски)
- Движението на домашни птици, оборудване и техника

### ПАЗЕТЕ ВИРУСЪТ ДАЛЕЧ

- Измийте и дезинфекцирайте обувки, дрехи, ръце, тави за яйца или плоскости, оборудване, каси, превозни средства и гуми, преди излизане и след влизане в/от зоната с птици
- Носете еднократни обувки и дрехи
- Изолирайте всички новозакупени птици 30 дни, преди да ги настаните в основното стадо
- Купувайте птици от регистрирани обекти, придружени с ветеринарномедицинско свидетелство

### ОГРАНИЧЕТЕ ПОСЕТИТЕЛИТЕ

- Предотвратете контакта на посетителите със стадото Ви и избягвайте посещения в други птицеферми
- Ако вие или друг трябва да посети фермата Ви - не забравяйте да си измие ръцете и да дезинфекцира ботушите, преди да влезнете в нея
- Използвайте и предлагайте еднократни покривала за обувки и дрехи

### ИЗБЯГВАЙТЕ ДИВИТЕ ПТИЦИ

- Дръжте диви птици и гризачи далеч от Вашите птици, водата и фуража за тях
- Не позволявайте на вашите домашни птици да имат контакт с мигриращи водолюбиви или други диви птици

### ИМАЙТЕ ПЛАН

- Направете план за биосигурност. Това е един от най-добрите начини да защитите птиците си от болести

ОФИЦИАЛЕН  
ВЕТЕРИНАРЕН  
ЛЕКАР

ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СМЪРТНОСТ НА ВАШИТЕ ПТИЦИ,  
ВИНАГИ ДОКЛАДВАЙТЕ НА:

ГОРЕЩИЯ ТЕЛЕФОН  
НА БАБХ:  
0700 12 299





## КАК ДА ЗАЩИТИТЕ ПТИЦИТЕ СИ?

ШЕСТ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ПТИЦИ!

### Избягвайте контакти с други птици!

- Забранете достъпа до вашите птици!
- Дръжте птиците си затворени!
- Не позволявайте контакти с външни лица, освен тези, които се грижат за Вашите птици!
- Не позволявайте достъп на външни посетители, които също отглеждат птици!
- Не позволявайте контакт с диви птици, защото те може да са евентуален източник на заболяване!
- Извършвайте контрол на гризачите!



### Поддържайте чистота!

- Винаги носете чисти дрехи!
- Почиствайте обувките си с дезинфектант преди да влезете в помещението за птици!
- Почиствайте ръцете си с вода, сапун и дезинфектант преди да влезете в помещението за птици!
- Цялото необходимо оборудване преди да се използва в помещението за птиците трябва да бъде правилно почистено и дезинфекцирано!
- Отстранете тора преди да извършите дезинфекцията!
- Трупове на мъртви птици да бъдат обезвредени!



## Не пренасяйте заболяването в дома си!

- Ако в близост до дома Ви се отглеждат други птици, почиствайте превозните средства и оборудването винаги преди да се върнете във вкъщи!
- Ако Вашите птици са били на изложба или на пазар за птици трябва да ги държите изолирано за период от 2 седмици от останалите птици в дома Ви!
- Ново закупените птици трябва да бъдат карантинирани за период от 30 дни!
- За да предотвратите поява на болести по птиците най-добре е да отглеждате отделно различните категории птици и те да бъдат разделени по възрастови групи!



## Не внасяйте заболявания от Вашите съседи!

- Не използвайте едно и също оборудване (хранилки, поилки и т.н.) с Вашите съседи!
- Ако не разполагате със собствено оборудване винаги преди употреба извършвайте щателно почистване и дезинфекция на оборудването, което ще използвате!





## Разпознаване на симптомите на заразните болести по птиците

*Много заболявания по птиците са трудни за диагностика. Ранното откриване на болестта позволява предотвратяване на разпространението ѝ. По-долу са посочени някои основни моменти, които насочват, че нещо се случва с Вашите птици:*

- Внезапно увеличаване на смъртността на птиците;
- Диария;
- Намаляване или напълно спиране на яйценосенето;
- Умърлушеност, задух, изтечения от носа;
- Загуба на енергия и апетит;
- Отоци около очите и врата;
- Мораво оцветяване по гребена, менгушите и краката;
- Депресия, тремор на мускулатурата, увисване на крилата; изкривяване на главата и врата; загуба на координация; пълна парализа.



## Сигнализиране за болни птици!

**НЕ ЧАКАЙТЕ, А СИГНАЛИЗИРАЙТЕ НЕЗАБАВНО !!!**

- Ранното откриване на заболели птици предотвратява разпространението на болестта!
- Ако откриете промени в здравословния статус на Вашите птици или неочаквана смъртност незабавно трябва да уведомите ветеринарния лекар, обслужващ обекта или кмета на населеното място!



## ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

- Почистването и дезинфекцията са едни от най-важните изисквания за предотвратяване възникването на заразно заболяване при вашите птици!
- Преди да дезинфекцирате превозни средства; оборудване; дрихи, обувки и т.н, предварително трябва да бъдат добре почистени с вода и сапун!

## ДЕЗИНФЕКТАНТИ

Продукт	Работни концентрации и не обходимо контактно време	Начин на приготвяне на работен разтвор	Подходящ за:
5,25% натриев хипохлорид (домашна белина)	3%, 2 часа	13,5 литра белина + 9 литра вода	Повърхности, животновъдни помещения, превозни средства, облекло, ръце, обувки, дезинфекционни вани
Оцетна киселина	4-5%, 4 часа	168 гр. ледена оцетна киселина + 4,5 литра вода	Повърхности, животновъдни помещения, превозни средства, облекло, ръце, обувки, дезинфекционни вани
Натриев карбонат (сода, пепел)	4%, 4 часа	150 гр. натриев карбонат + 4,5 литра гореща вода	Повърхности, животновъдни помещения, превозни средства, дезинфекционни вани
Натриев хидроксид (NaOH)	2%, 2 часа	1/3 водна чаша натриева основа към 4,5 литра вода	Повърхности, животновъдни помещения, превозни
Вар – гасена (CaOH <sub>2</sub> ) Вар – негасена (CaO)	Прах Гранула	Прибавя се неразредена	Твърд оборски тор, птица, почва средства, дезинфекционни вани

**НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ! ВИЕ СТЕ НАЙ - ДОБРАТА ЗАЩИТА ЗА ВАШИТЕ ПТИЦИ !**